I'm not a robot

Portal especializado em Dermatologia Veterinária. Artigos, dicas e novidades dermatológicas.Copyright ©2023 DermaConectaWebdesign by Aline Santana Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. Se seu pet sofre de dermatite, você está no lugar certo! Viemos falar sobre o Oclacitinib, um poderoso ativo para o tratamento e controle dermatites alérgicas e atópicas. Ficou interessado? Leia o post completo! O que é o Oclacitinib? O Maleato de Oclacitinib é uma molécula usada em vários países para tratamento e controle de prurido – incômodo que leva o animal a se lamber, mordiscar ou coçar – associado a dermatites em animais de pelo menos 1 ano. Ele age no sistema imunológico, bloqueando a função de JAK – uma enzima que causa a sensação de prurido – e de citocinas associadas, que são responsáveis pelas inflamações e prurido de processos alérgicos. Basicamente, ao bloquear essa enzima, o Oclacitinib reduz as manifestações clínicas da dermatite. Mas e os efeitos colaterais? Existem muitos estudos comparando o Oclacitinib com outros medicamentos utilizados para o mesmo tipo de tratamento, porém o Oclacitinib apresenta resultados mais cedo e menor ocorrência de efeitos colaterais. Além disso, o percentual de aproveitamento do organismo para com o ativo é bem mais alto que de outros medicamentos, chegando à 89% de aproveitamento. Qual a melhor forma de administrar esse medicamento? Primeiro, é importante saber que o Oclacitibib é um medicamento controlado, então só será disponibilizado com prescrição de um médico veterinário. O formato mais comum encontrado no mercado é em cápsulas de uso oral, mas sabemos que esse nem sempre é o formato mais confortável para o seu pet. Por isso, na Animal Farma, você pode manipular o medicamento em formato de biscoito e garantir que seu pet terá um estresse a menos durante o tratamento da dermatite e, de quebra, ainda ganha um petisco. O Oclacitinib também pode ser manipulado em spray para uso tópico, nas lesões causadas por todas as lambidas e sessões de coceira. Lembre-se: consulte um médico veterinário de confiança e peça pela manipulação. Assim você garante um tratamento 100% personalizado para o seu peludo! Além disso, existem outros produtos de uso tópico, como o nosso Shampoo Skin Pet, que podem ser usados junto ao tratamento para aliviar os sintomas mais incômodos da dermatite. Seu pedido pode ser feito por Whatsapp de forma fácil e rápida! Entre em contato com a unidade mais próxima de você. Fique ligado nas nossas redes sociais para sempre se atualizar sobre a animais de estimação, saúde pet, manipulação veterinária e muitos outros assuntos. Siga a Animal Farma no Instagram e Facebook! Também faça uma visita em uma de nossas unidades e farmácias próprias e franqueadas: Em Santa Catarina: Franqueadora Joinville Matriz América, Joinville Anita Garibaldi e Blumenau; No Rio Grande do Sul: Canoas; Em São Paulo: São Paulo Moema e São Paulo Tatuapé. Até a próxima! Se seu pet sofre de dermatite, você está no lugar certo! Viemos falar sobre o Oclacitinib, um poderoso ativo para o tratamento e controle dermatites alérgicas e atópicas. Ficou interessado? Leia o post completo! O que é o Oclacitinib? O Maleato de Oclacitinib é uma molécula usada em vários países para tratamento e controle de prurido – incômodo que leva o animal a se lamber, mordiscar ou coçar – associado a dermatites em animais de pelo menos 1 ano. Ele age no sistema imunológico, bloqueando a função de JAK – uma enzima que causa a sensação de prurido – e de citocinas associadas, que são responsáveis pelas inflamações e prurido de processos alérgicos. Basicamente, ao bloquear essa enzima, o Oclacitinib reduz as manifestações clínicas da dermatite. Mas e os efeitos colaterais? Existem muitos estudos comparando o Oclacitinib com outros medicamentos utilizados para o mesmo tipo de tratamento, porém o Oclacitinib apresenta resultados mais cedo e menor ocorrência de efeitos colaterais. Além disso, o percentual de aproveitamento do organismo para com o ativo é bem mais alto que de outros medicamentos, chegando à 89% de aproveitamento. Qual a melhor forma de administrar esse medicamento? Primeiro, é importante saber que o Oclacitibib é um medicamento controlado, então só será disponibilizado com prescrição de um médico veterinário. O formato mais comum encontrado no mercado é em cápsulas de uso oral, mas sabemos que esse nem sempre é o formato mais confortável para o seu pet. Por isso, na Animal Farma, você pode manipular o medicamento em formato de biscoito e garantir que seu pet terá um estresse a menos durante o tratamento da dermatite e, de quebra, ainda ganha um petisco. O Oclacitinib também pode ser manipulado em spray para uso tópico, nas lesões causadas por todas as lambidas e sessões de coceira. Lembre-se: consulte um médico veterinário de confiança e peça pela manipulação. Assim você garante um tratamento 100% personalizado para o seu peludo! Além disso, existem outros produtos de uso tópico, como o nosso Shampoo Skin Pet, que podem ser usados junto ao tratamento para aliviar os sintomas mais incômodos da dermatite. Seu pedido pode ser feito por Whatsapp de forma fácil e rápida! Entre em contato com a unidade mais próxima de você. Fique ligado nas nossas redes sociais para sempre se atualizar sobre a animais de estimação, saúde pet, manipulação veterinária e muitos outros assuntos. Siga a Animal Farma no Instagram e Facebook! Também faça uma visita em uma de nossas unidades e farmácias próprias e franqueadas: Em Santa Catarina: Franqueadora Joinville Matriz América, Joinville Anita Garibaldi e Blumenau; No Rio Grande do Sul: Canoas; Em São Paulo: São Paulo Moema e São Paulo Tatuapé. Até a próxima! Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossa Política de Privacidade. Ver fichas de Cachorros A alergia nos cachorros apresenta sintomas bem claros, como a coceira e a vermelhidão na pele. Muitas vezes, a coceira é tão intensa que deixa o tutor extremamente incomodado, além de causar grave desconforto ao animal. Dentre as doenças que causam coceira, a dermatite atópica canina é um dos destaques, sendo uma doença crônica, de cunho alérgico e bastante comum nos cachorros. As opções de tratamento para as alergias em cachorros são numerosas, mas alguns casos continuam sem uma solução definitiva. Para auxiliar no arsenal de medicamentos que atuam contra as alergias, temos o Apoquel para cachorro, ou oclacitinib, fabricado pela Pfizer Itália, que vem sendo utilizado com bons resultados no nosso país.Mas como funciona este medicamento? Qual a dose indicada para cachorros? Por quanto tempo posso usar? Tem efeitos colaterais? Para ajudar o leitor com essas e outras dúvidas, o PeritoAnimal elaborou este artigo, com explicações e dicas sobre o assunto. Aproveite! Índice O Apoquel é utilizado para o tratamento do prurido associado a dermatites alérgicas em cães. Também tem sido utilizado para o tratamento das manifestações clínicas de dermatites atópicas de cachorros. A patogênese da atopia canina é complexa e pouco compreendida, porém, acredita-se que animais geneticamente predispostos possuem uma deficiência na barreira cutânea, seja absorvendo, inalando ou ingerindo alérgenos que sensibilizam o sistema imunológico e ocasionarão respostas de hipersensibilidade do tipo I, causadas por aumento da imunoglobulina E (IgE).Os medicamentos mais comumente utilizados são os anti-inflamatórios esteroides (corticosteroides) que agirão cessando a inflamação e o prurido, porém, pela necessidade da utilização em longo prazo, esses medicamentos têm demonstrado inúmeros efeitos adversos em órgãos como fígado, adrenal, trato gastroentérico, levando à diminuição da qualidade e longevidade de vida dos animais.O Apoquel inibe a atividade de uma variedade de citocinas que causam prurido e inflamação, assim como de citocinas envolvidas em alergias e que dependem da atividade das enzimas JAK1 ou JAK3. Este medicamento exerce pouco efeito nas citocinas envolvidas na hematopoiese e que são dependentes da enzima JAK2.O Apoquel não é um corticosteroide ou um anti-histamínico. Apesar de os tutores apresentarem um elevado grau de satisfação com esse medicamento, o seu custo elevado ainda é impeditivo para vários animais. Além disso, o tratamento é prolongado, sendo necessário pelo menos um mês de tratamento.Alguns pesquisadores utilizaram o produto em dias alternados, associando corticoides ou não, obtendo bons resultados. No entanto, a dose e a duração do tratamento, assim como sua associação com outros fármacos, deverão ser definidas pelo veterinário, pois ele saberá o tempo necessário para o controle dos sintomas. A dose inicial recomendada pela bula do medicamento é de 0,4 a 0,6 mg/Kg de oclacitinib, administrado oralmente, duas vezes ao dia, por 14 dias. Para a terapia de manutenção (após os 14 dias iniciais), a mesma dose deve ser administrada (0,4 a 0,6 mg/kg), uma vez ao dia.A necessidade da terapia de manutenção de longa duração deve ser baseada numa avaliação de risco-benefício individual, realizada pelo médico veterinário responsável. Alguns animais podem ter boa resposta com o uso de Apoquel em dias alternados, dependendo do tipo de alergia e de sua gravidade. Mas atenção! Nunca medique seu cachorro por conta própria! Isso pode ser perigoso para a vida dele. O Apoquel é administrado por via oral, com apresentação em comprimidos. Nos primeiros 14 dias de tratamento, é indicado dar uma dose a cada 12 horas. Após esse período inicial, deverá ser fornecido ao cachorro apenas uma vez ao dia. Lembrando que esse protocolo pode variar conforme a necessidade do animal, sendo prescrito pelo veterinário. Os efeitos colaterais relatados por pesquisadores foram: Diarreia;Falta de apetite;Protuberâncias cutâneas e subcutâneas;Sonolência;Letargia.Em um estudo, foram relatados, além do vômito, aumento da sede e da produção de urina (poliúria e polidipsia) e aumento da fome. Além dos efeitos colaterais, a medicação deverá ser evitada em cachorros com menos de 12 semanas de vida e em animais com infecções severas, pois seu sistema imunológico ainda não está totalmente formado, no primeiro caso, ou pode estar fragilizado, tentando combater algum agente causador de doença.O medicamento pode ainda aumentar a suscetibilidade a infecções, incluindo demodicose e piorar condições com neoplasias. Esses efeitos colaterais podem ser reduzidos com a alteração na dose, mas somente o veterinário saberá dizer qual o melhor protocolo de tratamento para cada caso.Cachorros e cadelas que serão destinados à reprodução não devem utilizar este medicamento. Cadelas prenhes e que estão amamentando não podem tomar o Apoquel. Nesses casos, o motivo da coceira deverá ser investigado e tratado com outros medicamentos que possam ser utilizados por esses animais.Além disso, cachorros com doenças que são transmitidas de forma hereditária, como a demodicose, devem ser considerados como impróprios para a reprodução ou, pelo menos, a reprodução deverá ser ponderada, verificando-se o grau de gravidade de cada patologia e o risco de transmissão para os filhotes. Este artigo é meramente informativo, no PeritoAnimal.com.br não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se pretende ler mais artigos parecidos a Apoquel para cachorro: para que serve, doses, como usar e efeitos colaterais, recomendamos que entre na nossa categoria de Medicamentos. Bibliografia Souza, B.C. et al. Dermatite atópica canina: Revisão de Literatura. Science and Animal Health, v.10, 2022, p.38-62. Disponível em file:///C:/Users/carlamoreira/Downloads/22465-Texto%20do%20artigo-93070-1-10-20230801.pdf. Acesso em 08/07/2024.Bula do Apoquel, Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Disponível em . Acesso em 08/07/2024.Bizarro, A.F. et al. Protocolo alternativo com oclacitinib para dermatite atópica canina: Uma solução capaz de reduzir custos? Revista Portuguesa de Imunoalergologia, 2022. Disponível em . Acesso em 08/07/2024.Fundão, J.M, Almeida, T.O. Dermatite atópica canina, atualizações terapêuticas: Revisão de literatura. Disponível em . Acesso em 10/07/2024. Portal especializado em Dermatologia Veterinária. Artigos, dicas e novidades dermatológicas.Copyright ©2023 DermaConectaWebdesign by Aline Santana Portal especializado em Dermatologia Veterinária. Artigos, dicas e novidades dermatológicas.Copyright ©2023 DermaConectaWebdesign by Aline Santana Este medicamento pode ser encontrado em apresentações de uso humano, porém com literatura técnica que baseia seu uso na medicina veterinária. O uso de suas informações é de responsabilidade do médico veterinário. Princípio(s) Ativo(s) Receita Receita Simples - Oclacitinib 16 mg, comprimido - Oclacitinib 5,4 mg, comprimido - Oclacitinib 3,6 mg, comprimido Tratamento do prurido associado à dermatites alérgicas em cães. Tratamento das manifestações clínicas de dermatites atópicas em cães. Contraindicações / precauções Não deve ser utilizado em animais com hipersensibilidade ao princípio ativo.Não deve ser usado em filhotes com idade inferior a 12 meses.Não deve ser usado em casos de infecções severas. Efeitos adversos Os seguintes sinais clínicos adicionais foram reportados após o início do tratamento (porcentagem de cães com pelo menos um relato do sinal clinico como uma condição não pré- existente): pioderma (12,0%), protuberância dérmica não especificada (12,)%, otite (9,9%), vômito (9,2%), diarreia (6,0%), histiocitoma (3,9%), cistite (3,5%), anorexia (3,2%), letargia (2,8%), infecção dérmica por fungos (2,5%), pododermatite (2,5%), lipoma (2,1%), polidipsia (1,4%), linfoadenopatia (1,1%), aumento de apetite (1,1%), comportamento agressivo (1,1%), e perda de peso (0,7%). Reprodução, gestação e lactação Não deve ser utilizado e animais destinados à reprodução, ou em cadelas prenhes ou lactantes. - Tratamento inicial: 12 / 12 horas;- Tratamento prolongado: 24 / 24 horas. Duração do tratamento A duração do tratamento deve ser baseada numa avaliação individual, realizada pelo médico veterinário responsável. Dosagem indicada Dosagem para Cães Sem considerações medicamentosas O Aplicativo Vetsmart contém informações de interação medicamentosas em geral, que foram levantadas por pesquisa realizada pelo próprio Vetsmart, de modo que as informações médicas e sobre medicamentos não é um aconselhamento médico veterinário e não deve ser tratado como tal. Portanto, a Vetsmart não garante nem declara que a informação sobre tratamentos médicos veterinários ou interações medicamentosas do Aplicativo Vetsmart: (A) estará constantemente disponível, ou disponíveis a todos; ou (B) são verdadeiras, precisas, completas, atuais ou não enganosas. O oclacitinib inibe a atividade de uma variedade de citocinas pruridogênicas e pró-inflamatórias, assim como de citocinas envolvidas em alergias e que dependem da atividade das enzimas JAK1 ou JAK3.Exerce pouco efeito nas citocinas envolvidas na hematopoiese e que são dependentes da enzima JAK2. O oclacitinib não é um corticosteroide ou um antihistamínico Farmacocinética Em cães, o maleato de oclacitinib é absorvido bem e rapidamente após administração oral, com tempo médio para atingir o pico de concentração plasmática (Tmax) de menos de 1 hora.Após a administração oral de 0,4 – 0,6 mg de oclacitinib por Kg para 24 cães, a concentração média (limite de confiança de 90% - LC) máxima (Cmax) foi 324 (281, 372) ng/mL e a área média sob a curva de concentração plasmática – tempo, de 0 e extrapolada ao infinito (AUC 0-inf) foi 1890 (1690, 2110) ng-hr/mL.O estado prandial dos animais não afeta significantemente a taxa ou extensão da absorção.A biodisponibilidade absoluta do maleato de oclacitinib foi 89%.A ligação do oclacitinib às proteínas plasmáticas é baixa, com 66,3% - 69,7% de ligação em plasma canino fortificado com concentrações nominais variando de 10 – 1000 ng/mL. O volume de distribuição médio (95% LC) aparente em estado de equilíbrio foi 942 (870, 1014) mL/Kg de peso corporal.Nos cães, o oclacitinib é metabolizado em múltiplos metabólitos, e um metabólito oxidativo principal foi identificado no plasma e na urina. No geral, a principal rota de excreção é o metabolismo, com contribuições menores da eliminação renal e biliar.A inibição do citocromo canino P450 pelo oclacitinib é mínima com IC50 pelo menos 50 vezes maior do que os valores de Cmáx observados na dose de uso proposta.A excreção total média (95% LC) do oclacitinib do plasma foi baixa – 316 (237, 396) mL/h/kg de peso corporal (5,3 mL/min/Kg de peso corporal). Após administração IV eoral, o t1/2 terminal foi similar com valores médios de 3,5 (2,2, 4,7) e 4,1 (3,1, 5,2) horas, respectivamente. Considerações laboratoriais Podem apresentar uma queda de leucócitos (neutrófilos, eosinófilos e monócitos) e de globulina sérica, e um aumento de colesterol e lipase quando comparados ao grupo recebendo placebo, porém as médias do grupo mantiveram-se dentro da normalidade. Efeitos adversos Os seguintes sinais clínicos adicionais foram reportados após o início do tratamento (porcentagem de cães com pelo menos um relato do sinal clinico como uma condição não pré- existente): pioderma (12,0%), protuberância dérmica não especificada (12,)%, otite (9,9%), vômito (9,2%), diarreia (6,0%), histiocitoma (3,9%), cistite (3,5%), anorexia (3,2%), letargia (2,8%), infecção dérmica por fungos (2,5%), pododermatite (2,5%), lipoma (2,1%), polidipsia (1,4%), linfoadenopatia (1,1%), aumento de apetite (1,1%), comportamento agressivo (1,1%), e perda de peso (0,7%). Reprodução, gestação e lactação Não deve ser utilizado e animais destinados à reprodução, ou em cadelas prenhes ou lactantes. Monitoramento Monitorar o desenvolvimento de infecções, incluindo demodicose, e neoplasias. Este produto ainda não tem videos AVALIAR E ENVIAR ENVIANDO ENVIADO Este produto ainda não tem distribuidores COSGROVE, S. B. et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the Janus kinase inhibitor oclacitinib (Apoquel®) in client-owned dogs with atopic dermatitis. Veterinary Dermatology, v. 24, p. 587–e142, 2014.COSGROVE, S. B. et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. Veterinary dermatology. v 24, p. 479–e114, 2013.GADEYNE, C. et al. Efficacy of oclacitinib (Apoquel®) compared with prednisolone for the control of pruritus and clinical signs associated with allergic dermatitis in client-owned dogs in Australia. Veterinary dermatology. v. 25, p. 512–e86, 2014Relatório Público Europeu. Apoquel® (Oclacitinib) - resumo do EPAR destinado ao público. European Medicines Agency, 2013 Postal address: Norwegian Institute of Public Health WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo NorwayVisiting/delivery address: Myrens verksted 6H 0473 Oslo Norway Tel: +47 21 07 81 60E-mail: Copyright/Disclaimer O oclacitinib é aprovado pelo fda para uso em cães com pelo menos 1 (um) ano de idade, para o controle de prurido associado com dermatite alérgica e controle de dermatite atópica. Ivertril Ivertril 6mg P/ Cães De 15kg A 30kg 12 Cxs C/ 4 Comprimidos. Composição Básica Apoquel 3,6mg: Cada 100 mg de Apoquel Zoetis contém: Oclacitinib 3,6mg, Excipiente.. q.s.p.. 100m. Apoquel 5,4mg: Cada 100 mg de Apoquel Zoetis contém: Oclacitinib 5,4mg, Excipiente.. O Maleato de Oclacitinib é uma molécula usada em vários países para tratamento e controle de prurido – incômodo que leva o animal a se lamber, mordiscar ou coçar – associado a dermatites em animais de pelo menos 1 ano. Para acabar com a coceira e, mais que isso, ajudar você e seu amigo a ter uma vida tranquila, a Zoetis desenvolveu Apoquel. Uma tecnologia criada pelos pesquisadores da Zoetis e que proporciona um alívio rápido da coceira, agindo em até 4 horas, atuando diretamente na fonte do problema. Apoquel proporciona alívio rápido em quatro horas, com controle efetivo da coceira por 24 horas após uma dose única. ou 3x de R$ 59,97. APOQUEL (maleato de oclacitinib) é um inibidor sintético da Janus Quinase (JAK). É indicado para o tratamento do prurido associado às dermatites alérgicas e das manifestações clínicas de dermatites atópicas em cães. ... O alívio da coceira, conforto para seu animal. Maleato de Oclacitinib O alívio da coceira, conforto para seu animal. Apoquel é a evolução no tratamento da coceira associada às dermatites alérgicas, inclusive a dermatite atópica. Inovador princípio ativo, o Maleato de Oclacitinib. Apoquel tem efeito rápido, alivia a coceira em 4 horas. Qual é o risco associado ao Apoquel? Os efeitos secundários mais frequentes foram diarreia, vómitos e perda de apetite, por ordem decrescente de frequência. O Apoquel não deve ser administrado a cães com idade inferior a um ano ou peso inferior a 3 kg. Apoquel proporciona alívio rápido em quatro horas, com controle efetivo da coceira por 24 horas após uma dose única. Como o Apoquel Age nos Cães A substância melato de oclacitinib funciona interrompendo os sinais nervosos responsáveis pelo incômodo da coceira no cérebro, fazendo com que o cão pare de coçar o local e que seu organismo consiga defender-se e eliminar de forma permanente os sintomas da alergia. Administrar por via oral. Pode ser administrado acompanhado ou não de alimentos. A dose inicial recomendada é de 0,4 a 0,6mg/Kg de oclacitinib, duas vezes ao dia, por 14 dias. Após esse período inicial de 14 dias, administrar a mesma dose, uma vez ao dia. Administrar por via oral. Pode ser administrado acompanhado ou não de alimentos. A dose inicial recomendada é de 0,4 a 0,6mg/Kg de oclacitinib, duas vezes ao dia, por 14 dias. Após esse período inicial de 14 dias, administrar a mesma dose, uma vez ao dia. Administrar por via oral. Pode ser administrado acompanhado ou não de alimentos. A dose inicial recomendada é de 0,4 a 0,6mg/Kg de oclacitinib, duas vezes ao dia, por 14 dias. Após esse período inicial de 14 dias, administrar a mesma dose, uma vez ao dia. APOQUEL pode aumentar a suscetibilidade a infecções, incluindo demodicose, e exacerbar condições neoplásicas. Este produto não é para uso humano. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Lavar as mãos imediatamente após manusear os comprimidos. Apoquel Dosagem e Administração: Inicialmente, a dose recomendada de Apoquel (oclacitinib) é de 0,4 a 0,6 mg/Kg e deve ser administrada oralmente duas vezes ao dia, por 14 dias. Após os 14 dias iniciais, a terapia de manutenção deve ser administrada com a mesma dosagem (0,4 a 0,6 mg/Kg), contudo apenas uma vez ao dia. Para acabar com a coceira e, mais que isso, ajudar você e seu amigo a ter uma vida tranquila, a Zoetis desenvolveu Apoquel. Uma tecnologia criada pelos pesquisadores da Zoetis e que proporciona um alívio rápido da coceira, agindo em até 4 horas, atuando diretamente na fonte do problema. Inicialmente, a dose recomendada de Apoquel (oclacitinib) é de 0,4 a 0,6 mg/Kg e deve ser administrada oralmente duas vezes ao dia, por 14 dias. Dosagem e Administração: A dose inicial recomendada é de 0,4 a 0,6 mg/Kg de oclacitinib, administrado oralmente, duas vezes ao dia, por 14 dias. de manutenção de longa duração deve ser baseada numa avaliação de risco- benefício individual, realizada pelo médico veterinário responsável. ©2025 ✪ EuQueroSaberTudo.com ✪